



**WYNIKI ANALIZY DŁUGOTERMINOWEJ  
STOSOWANIA:**

**LIPOCOLL HA HYDRO SERUM  
ORAZ  
LIPOCOLL HYDRO SERUM + LIFTING FACE CREAM**


## Lipocoll HA Hydro Serum

**15 % kolagenu liposomalnego + 5 % kwasu hialuronowego liposomalnego**

### POMIAR TEWL

Probant 4 po 50 r.ż.

| Czas [min] | Próba badana [g/h/m <sup>3</sup> ] | Próba kontrolna [g/h/m <sup>3</sup> ] |
|------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 0          | 9,1                                | 5,6                                   |
| 30         | 2,8                                | 6,0                                   |
| 60         | 3,3                                | 6,4                                   |
| 120        | 3,0                                | 5,2                                   |
| 180        | 5,3                                | 7,4                                   |
| 240        | 5,6                                | 5,8                                   |
| 300        | 5,0                                | 6,5                                   |
| 360        | 5,1                                | 7,5                                   |



### Wniosek:

**Mniejsza utrata wody transepidermalnej po zastosowaniu próbki badanej.**

## Lipocoll HA Hydro Serum + Lifting Face Cream


**15 % kolagenu liposomalnego + 5 % kwasu hialuronowego liposomalnego**

### BADANIE NAWILŻENIA

Proband 1 po 50 r.ż.

| Czas [min] | Próba badana | Próba kontrolna |
|------------|--------------|-----------------|
| 0          | 47           | 40              |
| 30         | 44           | 38              |
| 60         | 43           | 39              |
| 120        | 42           | 38              |
| 180        | 41           | 40              |
| 240        | 41           | 39              |
| 300        | 41           | 40              |
| 360        | 41           | 40              |

Zależność nawilżenia od czasu



### Wnioski:


**Zwiększenie nawilżenia po zastosowaniu próbek badanych utrzymujące się w czasie**

**Zastosowanie dodatkowo Lifting Face Cream z Phytoderminą stworzyło okluzję zapobiegającą utracie wody przez skórę, stąd utrzymujący się poziom nawilżenia skóry**

## POMIAR TEWL

Probant 3 po 50 r.ż.

| Czas [min] | Próba badana [g/h*m <sup>2</sup> ] | Próba kontrolna [g/h*m <sup>2</sup> ] |
|------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 0          | 3,7                                | 7,4                                   |
| 30         | 2,3                                | 6,8                                   |
| 60         | 6,8                                | 7,0                                   |
| 120        | 0,9                                | 7,8                                   |
| 180        | 9,0                                | 7,4                                   |
| 240        | 3,4                                | 8,1                                   |
| 300        | 4,8                                | 8,6                                   |
| 360        | 5,2                                | 10,3                                  |



### Wnioski:

**Znacząco zmniejszona utrata wody przeznaskórkowej po zastosowaniu obu próbek badanych.**

**Zatrzymanie poziomu nawilżenia skóry przez dłuższy czas.**